

La loutre à la reconquête du Lignon

La **Loutre d'Europe** ou **Loutre européenne** (*Lutra lutra*), souvent qualifiée de **loutre commune** dans les pays d'Europe où elle est présente, est un mammifère carnivore semi-aquatique et principalement nocturne, de la famille des Mustélidés (sous-famille Lutrinés). Elle est l'une des trois espèces de loutres se rattachant au genre *lutra*. En France, on ne trouve que cette seule espèce de loutre.

Sa hauteur est d'environ 30 cm au garrot. Son pelage, brun foncé, est composé de deux couches : le poil de bourre, court, très fin, dense et laineux ; et le poil de jarre, long, lisse, brillant et imperméable. Excellente nageuse, elle dispose de pattes palmées, d'un corps allongé (60 à 80 cm en moyenne, auquel il faut ajouter une queue épaisse à la base et s'effilant vers l'extrémité de 30 à 40 cm de longueur), pour un poids pouvant aller de 5 à 15 kg.



PRESENCE SUR LE BASSIN DU LIGNON

Un petit effectif de loutres est présent sur le bassin du Lignon. Il y aurait 7 sept individus adultes.

Des empreintes et épreintes d'une loutre et de son loutron ont été observé à Boën. Le bassin versant du Lignon est celui qui accueille le plus d'individus dans le département de la Loire.



COMPORTEMENT

Elle vit au bord des cours d'eau (ruisseaux, rivières et même fleuves), jusqu'à une altitude de 1 300 m, dans les marais et parfois sur les côtes marines. Elle est habituellement solitaire, occupant un territoire de 5 à 15 km de rives le long d'un cours d'eau (parfois davantage) ou de 20 à 30 km² en zone de marais. Elle emprunte régulièrement les mêmes passages sur la berge pour se mettre à l'eau : les « coulées ». Lorsqu'elle sort de l'eau, elle se roule dans l'herbe pour essuyer sa fourrure, sur des zones reconnaissables à l'herbe couchée et appelées « places de ressui ».

Elle fait sa tanière (qu'on appelle une « catiche », de l'ancien français "se catir" = se blottir, se cacher) entre les racines des arbres des berges des cours d'eau ou dans d'autres cavités (cavité rocheuse, tronc creux, terrier d'une autre espèce). La catiche contient souvent une entrée plus ou moins dissimulée au-dessous du niveau d'eau et un conduit d'aération.⁷

REPRODUCTION

La maturité sexuelle est atteinte entre 2 et 3 ans.. La durée de la gestation est de 58 à 60 jours. La taille des portées varie entre 1,5 et 2,8 loutrons. L'émancipation des jeunes a lieu entre 6 et 18 mois.

ALIMENTATION

La Loutre est essentiellement piscivore. Elle se nourrit d'espèces de poissons différentes (anguilles, truites, poissons blancs, tanches...) en fonction du milieu et de la saison. Par ailleurs, elles consomment assez fréquemment des batraciens et des écrevisses

